

DURVET, INC.

100 SE MAGELLAN DRIVE, BLUE SPRINGS, MO, 64014

Teléfono: 816-229-9101

Llamada gratuita: 800-821-5570

Fax: 816-224-3080

Sitio web: www.durvet.com

Email: info@durvet.com



Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de la información publicada. Sin embargo, es responsabilidad de los lectores familiarizarse con la información del producto contenida en la etiqueta del producto o en el prospecto del producto de los EE.

LINCOMYCIN 300 INYECCION

Durvet

Lincomicina inyectable

marca de clorhidrato de lincomicina inyectable

300 mg / ml

Inyección de clorhidrato de lincomicina estéril

Antibiótico porcino

F o uso intramuscular solo en cerdos

Lincomycin Injectable contiene clorhidrato de lincomicina, un antibiótico producido por *Streptomyces lincolnensis* var. *lincolnensis*, que es químicamente distinta de todos los otros antibióticos disponibles clínicamente y se aísla como un sólido cristalino blanco.

INDICACIONES PARA EL CERDO

Lincomycin Injectable está indicado para el tratamiento de formas infecciosas de artritis causada por organismos sensibles a su actividad. Esto incluye la mayoría de los organismos responsables de las diversas artritis infecciosas en los cerdos, como estafilococos, estreptococos, *Erysipelothrix* y *Mycoplasma spp*.

También está indicado para el tratamiento de la neumonía por micoplasma.

CONTRAINDICACIONES

Al igual que con todos los medicamentos, el uso de Lincomycin Injectable está contraindicado en animales que previamente se consideraron hipersensibles al medicamento.

ADVERTENCIA

Los cerdos destinados al consumo humano no deben ser sacrificados dentro de las 48 horas posteriores al último tratamiento. **No para uso humano.**

PRECAUCIÓN

Si no se observa mejoría dentro de las 48 horas, consulte a un veterinario.

REACCIONES ADVERSAS

La administración intramuscular a los cerdos puede causar diarrea transitoria o heces blandas. Aunque este efecto rara vez se ha informado, uno debe estar alerta a la posibilidad de que pueda ocurrir. Si esto ocurre, es importante que se tomen las medidas necesarias para prevenir los efectos de la deshidratación.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Para la artritis o neumonía por micoplasma: 5 mg por libra de peso corporal por vía intramuscular una vez al día durante tres a siete días, según sea necesario.

Cuando use Lincomycin Injectable que contenga 300 mg / ml, 1 ml / 60 lb. de peso corporal proporcionará 5 mg / lb.

Para obtener resultados óptimos, inicie el tratamiento lo antes posible. Al igual que con cualquier frasco de dosis múltiples, practique técnicas asépticas para retirar cada dosis. Limpie y desinfecte adecuadamente el cierre del vial antes de ingresar con una aguja y jeringa estériles. Ningún cierre de vial debe introducirse más de 20 veces.

CÓMO SUMINISTRADO

Lincomycin Injectable está disponible en una concentración: 300 mg / ml.

300 mg / ml: para uso en cerdos que pesen 300 libras o más. Cada ml contiene clorhidrato de lincomicina equivalente a lincomicina, 300 mg; También alcohol bencílico, 9,45 mg añadidos como conservante. Se suministra en viales de 100 ml.

Para uso intramuscular en cerdos de más de 300 lbs. Droga restringida: uso exclusivo según lo indicado (California). Para uso exclusivo en animales.

Almacene a temperatura ambiente controlada: 20 ° a 25 ° C (68 ° a 77 ° F) [vea USP].

ANADA: # 200-315, Aprobado por la FDA

Fabricado para **DURVET, INC.**, Blue Springs, MO 64014

www.durvet.com

Fabricado por Sparhawk Laboratories, Inc., Lenexa, KS 66215, EE.UU.

CONTENIDOS NETOS:	NDC	
100 ML (3.3 fl oz)	30798-336-10	L-4636-04 Rev. 12-16

CPN: 1084270.3