

LABORATORIOS SPARHAWK, INC.

12340 SANTA FE TRAIL DRIVE, LENEXA, KS, 66215

Teléfono: 913-888-7500
Mesa de pedidos: 800-255-6368
Fax: 913-888-6741
Sitio web: www.sparhawklabs.com
Email: sli@sparhawklabs.com



Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de la información publicada. Sin embargo, es responsabilidad de los lectores familiarizarse con la información del producto contenida en la etiqueta del producto o en el prospecto del producto de los EE.

INYECCION DE GENTAMICINA

Sparhawk

(SULFATO DE GENTAMICINA, USP)

Inyección de lechones-5mg / mL

Inyección de lechones veterinaria

Antibacteriano

Para lechones de hasta 3 días de edad.

DESCRIPCIÓN: Gentamicin Piglet Injection es una preparación estéril para administración intramuscular en lechones de hasta 3 días de edad. Cada mililitro contiene sulfato de gentamicina, USP equivalente a 5 mg de base de gentamicina, 2 mg de bisulfato de sodio, 0,1 mg de edetato disódico, 7,46 mg de acetato de sodio, 3 mg de ácido acético glacial; 1.3 mg de metilparabeno y 0.2 mg de propilparabeno como conservantes, agua para inyección qs

ADVERTENCIA: Para uso en lechones de hasta 3 días de edad solamente. Los lechones inyectados con Gentamicin Piglet Injection no deben ser sacrificados como alimento durante al menos cuarenta (40) días después del tratamiento. El uso de más de la dosis recomendada dará lugar a residuos de tejido de gentamicina más allá de cuarenta (40) días.

INDICACIONES: Gentamicin Piglet Injection se recomienda para el tratamiento del colibacillus porcino causado por cepas de *E. coli* sensibles a la gentamicina.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dosis recomendada es de 1 ml (5 mg) administrada por vía intramuscular. Gentamicin Piglet Injection no debe usarse más de una vez en cada lechón. Si los lechones no responden al tratamiento con Gentamicin Piglet Injection, el diagnóstico debe reevaluarse. Limpie y esterilice las agujas y jeringas hirviéndolas en agua durante 15 minutos antes de usarlas. Antes de la inyección, desinfecte el lugar de la inyección y la parte superior del vial con un desinfectante adecuado, como el 70% de alcohol.

Tome todas las precauciones para evitar la contaminación del contenido del vial.

CONTRAINDICACIONES: No hay contraindicaciones conocidas de este medicamento cuando se usa según las indicaciones.

PRECAUCIONES: Almacenar entre 2 ° y 30 ° C (36 ° y 86 ° F).

Proteger de la congelación.

QUÍMICA: La gentamicina es una mezcla de antibióticos aminoglucósidos derivados de la fermentación de *Micromonospora purpurea*. El sulfato de gentamicina, USP es una mezcla de sales de sulfato de los antibióticos producidos en esta fermentación. Las sales son débilmente ácidas y libremente solubles en agua. El sulfato de gentamicina, USP es estable en solución por el período de tiempo indicado en las etiquetas hasta la fecha de vencimiento.

El sulfato de gentamicina, USP, contiene no menos de 500 microgramos de base de gentamicina por miligramo.

CÓMO SE SUMINISTRA: Gentamicin Piglet Injection, 5 mg / ml está disponible en viales de dosis múltiples de 250 ml.

Druga restringida (California) - use solo como se indica.

Lea atentamente las instrucciones que lo acompañan.

Sólo para uso intramuscular.

ANADA #: 200-394, Aprobado por la FDA

Fabricado por Sparhawk Laboratories, Inc., Lenexa, KS 66215

CONTENIDOS NETOS:		
8.5 oz (250 ml)	250 dosis	G-6639-05 Rev. 2-09

CPN: 1051005.1