

ELANCO ANIMAL HEALTH

A Division of Eli Lilly & Co.

2500 WAY INNOVATION, GREENFIELD, IN, 46140

Cuadro de distribución principal: 317-433-4800
Servicio al cliente: 317-276-1262
Servicio al cliente de productos de animales pequeños: 888-545-5973
Servicios técnicos: 800-428-4441
Fax: 317-276-2270
Sitio web: www.elanco.com
Email: elanco@elanco.com



Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de la información publicada. Sin embargo, es responsabilidad de los lectores familiarizarse con la información del producto contenida en la etiqueta del producto o en el prospecto del producto de los EE.

Inactivo - El contenido puede estar desactualizado

Este producto ha sido reemplazado por [Tylan® 200 Injection \(Elanco US\)](#)

INYECCIÓN TYLAN® 200

Elanco

Inyección de tilosina 200 mg por ml

Para uso en ganado y cerdos solamente

Un antibiótico

500 ml - Use solo equipo de jeringa automática

Indicaciones: En bovinos de carne y en ganado lechero no lactante, Tylan 200 Injection está indicado para su uso en el tratamiento del complejo respiratorio bovino (fiebre de envío, neumonía) generalmente asociado con *Pasteurella multocida* y *Actinomyces pyogenes*; podredumbre del pie (pododermatitis necrótica) y difteria de la pantorrilla causada por *Fusobacterium necrophorum* y metritis causada por *Actinomyces pyogenes*.

En cerdos, Tylan 200 Injection está indicado para su uso en el tratamiento de la artritis porcina causada por *Mycoplasma hyosynoviae*; neumonía porcina causada por *Pasteurella* spp.; *Erysipela* porcina causada por *Erysipelothrix rhusiopathiae*; Disentería porcina asociada con *Treponema hyodysenteriae* cuando se sigue con la medicación adecuada en el agua de bebida y / o en la alimentación.

Cada ml contiene 200 mg de actividad de tilosina (como base de tilosina) en 50 por ciento de propilenglicol con 4 por ciento de alcohol bencílico y agua para inyección.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: Tylan 200 Injection se administra por vía intramuscular.

GANADO DE CARNE Y GANADO NO LACTANTE DE LECHE: inyecte por vía intramuscular 8 mg por libra de peso corporal una vez al día (1 ml por 25 libras). El tratamiento debe continuarse durante 24 horas después de la remisión de los signos de la enfermedad, sin exceder los 5 días. No inyecte más de 10 ml por sitio.

PORCINA: inyecte por vía intramuscular 4 mg por libra de peso corporal (1 ml por 50 libras) dos veces al día. El tratamiento debe continuarse durante 24 horas después de la remisión de los signos de la enfermedad, sin exceder los 3 días. No inyecte más de 5 ml por sitio.

Lea las instrucciones que lo acompañan completamente antes de usar.

PRECAUCIÓN:

No mezcle Tylan 200 Injection con otras soluciones inyectables ya que esto puede causar una precipitación de los ingredientes activos.

ADVERTENCIAS:

NO PARA USO HUMANO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Las reacciones adversas, incluyendo el shock y la muerte, pueden resultar de una sobredosis en los cerditos.

No intente inyectar en cerdos que pesen menos de 25 libras (0.5 ml) con la jeringa común. Se recomienda que Tylan 50 Injection se use en cerdos que pesen menos de 25 libras.

No administrar a caballos u otros equinos. La inyección de tilosina en equinos ha sido fatal.

ADVERTENCIA DE RESIDUOS: cerdos: los cerdos destinados al consumo humano no deben ser sacrificados dentro de los 14 días posteriores al último uso de este medicamento.

ADVERTENCIA DE RESIDUOS: Ganado: El ganado destinado al consumo humano no debe ser sacrificado dentro de los 21 días posteriores al último uso de este medicamento. Este medicamento no está aprobado para su uso en hembras lecheras de 20 meses de edad o más, incluidas las vacas lecheras secas. El uso en este ganado puede causar residuos de drogas en la leche y / o en terneros nacidos de estas vacas. Este producto no está aprobado para su uso en terneras destinadas a ser procesadas para ternera. No se ha establecido un período de retirada en los terneros pre-rumiantes.

Si se utiliza agua medicada con tilosina como tratamiento de seguimiento para la disentería porcina, el animal debe recibir posteriormente alimento que contenga de 40 a 100 g de tilosina por tonelada durante 2 semanas para asegurar el agotamiento de los residuos de tejido.

Almacene a 25 ° C (77 ° F) o menos.

Elanco, Tylan y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de Eli Lilly and Company, sus subsidiarias o afiliadas.

Droga restringida (California) - Use solo según lo indicado.

NADA 12-965, Aprobado por la FDA

Para informar sobre efectos adversos, acceder a información médica u obtener información adicional sobre el producto, llame al 1-800-428-4441.

Fabricado para: Elanco Animal Health, una división de Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, EE. UU.

250 ml	AH0206	YL086436AMA
Tamaño profesional de 500 ml Use solo equipo de jeringa automático	AH0206	YL086435AMA

CPN: 1031013.5